

【원료약품 및 분량】 (본제 1정 중)

	S 정 (100mg)	SM 정 (200mg)	M 정 (400mg)	L 정 (800mg)
【유효 성분】 크리스데살라진 (Crisdesalazine, 별규)	10mg	20mg	40mg	80mg
【보존제】 벤조산 (Benzoic acid, KVP)	0.05mg	0.1mg	0.2mg	0.4mg
소르브산 (Sorbic acid, KVP)	0.01mg	0.02mg	0.04mg	0.08mg

【첨가제 성분】

스테아르산마그네슘 (Magnesium stearate, KVP)	5mg	10mg	20mg	40mg
실리콘디옥사이드 (Silicone dioxide, KVP)	적당량	적당량	적당량	적당량
미결정셀룰로오스 (Microcrystalline cellulose, KVP) ...	적당량	적당량	적당량	적당량
가금부산물건조분 (Poultry by-product powder, 별규)	적당량	적당량	적당량	적당량
건조효모 (Dried yeast, 식품공전)	적당량	적당량	적당량	적당량
포도당 (Glucose, 식품공전)	적당량	적당량	적당량	적당량

【제형 및 성상】

- 가. 제형: 츠어블 정제
나. 성상: 갈색의 원형 정제이다.

【제조방법】

- 가. 동물용의약품공정서 제제총칙 중 정제 제법에 따라 제조한다.
나. 전공정 위탁제조
- 제조의뢰자: (주)지엔티파마 (경기도 용인시 기흥구 용구대로 1855번길 23)
- 제조자: (주)엘티사이언스 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 38)

【효능 및 효과】

- 가. 대상 축종: 개
나. 인지기능장애증후군 임상 증상의 완화

【용법 및 용량】

- 1일 용량으로 체중 kg 당 크리스데살라진으로서 3.3~6.7mg이 되도록 경구 투여한다.
체중에 따른 본제의 투여용량은 다음과 같다.

개 체중 (kg)	투여할 제품의 함량 및 투여 정 수			
	제다큐어 츠어블정 S정 (크리스데살라진 10mg)	제다큐어 츠어블정 SM정 (크리스데살라진 20mg)	제다큐어 츠어블정 M정 (크리스데살라진 40mg)	제다큐어 츠어블정 L정 (크리스데살라진 80mg)
1.5이상-3미만	1 정			
3이상-6미만		1 정		
6이상-12미만			1 정	
12이상-24미만				1 정
24이상	체중에 따라 적합한 정제를 조합하여 투여한다.			

【포장단위】

30 정 / 1 pack

【저장방법 및 유효기간】

- 가. 저장방법: 직사광선을 피하고 건조한 실온(1~30°C)에서 보관할 것.
나. 용기종류: 밀봉용기
다. 유효기간: 제조일로부터 36개월

【주의사항】

- 가. 다음 환축에게는 투여하지 말 것
1) 아스피린 혹은 설파살라진에 과민성이 있는 개에는 사용하지 마십시오.
2) 본 제품의 유효성분 및 첨가제 성분에 과민성이 있는 개에는 사용하지 마십시오.
3) 중증의 간 기능 이상 또는 중증의 신장 기능 이상이 있는 환축에는 사용하지 마십시오.
나. 부작용
1) 구토, 설사 등 소화기 장애 유발 시 투약을 중지하십시오.
2) 제품 투여로 인한 과민반응이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오.
다. 상호작용
1) 소염제, 항응고제 또는 이뇨제와 병용하여 사용하지 마십시오.
라. 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠약축 등에 대한 투여
1) 임신견 및 수유견에서의 안전성이 충분히 입증되지 않았으므로 사용하지 마십시오.
마. 과용량 등에 대한 처치
1) 비글 개에서의 13주 만성독성시험 결과 유지용량의 30~60배에서 간장 및 신장의 적응적 변화 및 갑상선에서 이차적인 변화가 관찰되는바, 이러한 장기와 관련된 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 수의사의 지시에 따라 적절한 조치를 취하십시오.
바. 적용상의 주의사항
1) 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
2) 수의사의 판단에 따라 필요한 경우 츠어블 정제를 분쇄하여 투여하십시오.
3) 24kg 이상의 개에서는 수의사의 처방에 따라 적절한 용량을 투여하십시오.
사. 저장상의 주의사항
1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2) 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장 방법을 준수하십시오.
3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기하십시오.
4) 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 햇빛이 차단된 장소에 보관하십시오.
5) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
아. 기타 주의사항
1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
3) 사용방법(주의사항)을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
5) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 판매사 또는 구입처로 연락해주시십시오.